

О мерах профилактики энтеровирусной инфекции

В летне-осенний период ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

Энтеровирусная инфекция – болезнь, вызываемая энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешней среде. Энтеровирусы хорошо переносят низкие температуры: в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до двух месяцев.

Источником инфекции может быть больной человек или здоровый носитель вируса. При этом велика роль здоровых носителей инфекции как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых лиц составляет до 46%. Вирус легко заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, контактно-бытовой, воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.

Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и периферическую нервную систему, сердце, легкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения). В связи с этим выделяют различные формы заболевания.

На территории Омской области ежегодно сезонный подъем заболеваемости ЭВИ отмечается, преимущественно, с июля, что связано с началом массового купания людей в открытых водоемах. Средств специфической иммунопрофилактики ЭВИ на сегодняшний день не разработано, при этом в очагах ЭВИ допускается применение средств экстренной профилактики в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств в соответствии с инструкциями по их применению по назначению врача.

С целью недопущения возникновения и распространения энтеровирусных инфекций издано Постановление главного государственного санитарного врача по Омской области от 02.06.2017 г. № 284 «Об эпидемиологической ситуации и мерах профилактики энтеровирусной инфекции в Омской области», где органам исполнительной власти, главам муниципальных образований, руководителям детских образовательных учреждений рекомендовано принять необходимые меры, направленные на выполнение профилактических, противоэпидемических, дезинфекционных мероприятий в полном объеме.

В настоящее время введен комплекс дополнительных мероприятий по профилактике энтеровирусной инфекции во всех детских образовательных учреждениях: утренний фильтр, дезинфекционные мероприятия, лабораторное обследование контактных лиц.

По информации специалистов региональных научно-методических центров по изучению ЭВИ, референс-центра по мониторингу за ЭВИ, в сентябре прогнозируется второй подъем заболеваемости, обусловленный формированием детских коллективов в учебном году.

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!

Уважаемые родители!!!

В летне-осенний период ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями.

Энтеровирусная инфекция – болезнь, вызываемая энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешней среде.

Источником инфекции может быть больной человек или здоровый носитель вируса. При этом велика роль здоровых носителей инфекции как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых лиц составляет до 46%.

Вирус легко заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы с водой, пищей. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются: водный, контактно-бытовой,

воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.

В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусной инфекцией рекомендуется придерживаться следующих правил:

- **соблюдать правила личной гигиены - мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, возвращения с улицы;**
- **использовать для питья кипяченую или бутилированную воду;**
- **соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в пищу продукты с известными сроками хранения;**
- **овощи, фрукты, ягоды употреблять в пищу только после того, как они будут тщательно вымыты;**
- **воздержаться от купания в открытых водоемах;**
- **ограничить допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации.**

При возникновении признаков инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь на лице, руках и ногах, респираторный синдром, расстройство желудочно-кишечного тракта и др.) следует обратиться к врачу.